

				0歳	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	1歳	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12歳	13歳	
B型肝炎	不活化ワクチン		定期	日本	1-2 → ← 3 →													1歳までに計3回の接種が必要です。3回目は2回目から4~5ヶ月後に行います 1歳をすぎて未接種の場合は、早めの接種をおすすめします（任意接種）												
				シンガポール	1	2	3																							
BCG	生ワクチン		定期	日本	1 →																									
				シンガポール	1														3種混合追加接種 (任意)			2種混合追加接種 (任意)								
5種混合 <small>ジフテリア/破傷風/百日咳/ポリオ/ヒブ</small>	不活化ワクチン		定期	日本	1-2-3 →			← 4 →													3種混合追加接種 (任意)			2種混合追加接種 (任意)						
				シンガポール	1	2	3														4	4種混合追加接種			5					
6種混合 <small>5種混合+B型肝炎</small>	不活化ワクチン		定期	シンガポール	1	2	3														1回目の6~28日後に2回目、2回目の1年後に3回目			1-2-3 →			4			
日本脳炎 <small>Imojevワクチン</small>	不活化ワクチン		定期	日本	5種混合を接種													1-2-3 →			4									
	生ワクチン		任意	シンガポール	1													2												
ロタウイルス <small>2回タイプ</small>	生ワクチン		定期	日本	1-2 →																									
			任意	シンガポール	1	2																								
ロタウイルス <small>3回タイプ</small>	生ワクチン		定期	日本	1-2-3 →																									
			任意	シンガポール	1	2	3																							
小児用肺炎球菌	不活化ワクチン		定期	日本	1-2-3 →			← 4 →																						
			任意	シンガポール	1		2	3																						
A型肝炎	不活化ワクチン		任意	日本														【1歳から接種可能】 1回目の2~4週間後に2回目、2回目の半年後に3回目												
			任意	シンガポール														【1歳から接種可能】 1回目の6~12か月後に2回目												
A+B型肝炎	不活化ワクチン		任意	シンガポール														【1歳から接種可能】			■ 接種開始が1~15歳は [2回接種] 1回目の6~12か月に2回目			■ 接種開始が16歳以上は [3回接種] 1回目の1か月後に2回目、1回目の半年後に3回目						
新型コロナ	mRNAワクチン		随時	日本	← 1回目の通常3週間後に2回目、2回目の8週間後に3回目を接種 →													通常3週間隔で2回。2回目後、5ヶ月以上あけて3回目												
			随時	シンガポール	[6ヶ月~4歳]													■ Modernaワクチン [2回接種] 1回目の8週間後に2回目 ※5~17歳にPfizerワクチンを1回追加接種			■ Pfizerワクチン [3回接種] 1回目の8週間後に2回目、2回目の8週間後に3回目									
				[5~17歳]													■ Pfizerワクチン [3回接種] 1回目の8週間後に2回目、2回目の5か月後に3回目													

