

| ことひあクリニック COTOVIA CLINIC | | | | 0歳 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 1歳 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
|-------------------------------------|--|--|--|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| B型肝炎 | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 定期 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| BCG | | | | 生ワクチン | 注射器 | 定期 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 5種混合 ジフテリア/破傷風/百日咳/ポリオ/ヒブ | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 定期 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 6種混合 5種混合+B型肝炎 | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 定期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 日本脳炎 Imojevワクチン | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 定期 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | | | 生ワクチン | 注射器 | 任意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| ロタウイルス 2回タイプ | | | | 生ワクチン | 滴管・瓶 | 定期 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| ロタウイルス 3回タイプ | | | | 生ワクチン | 滴管・瓶 | 定期 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 小児用肺炎球菌 | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 定期 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 小児用肺炎球菌 (10価13価) | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 任意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 小児用肺炎球菌 (15価20価) | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 任意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| A型肝炎 | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 任意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| A+B型肝炎 | | | | 不活化ワクチン | 注射器 | 任意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 新型コロナ | | | | mRNAワクチン | 注射器 | 随时 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | | | | 随时 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |

1歳までに計3回の接種が必要です。3回目は2回目から4~5ヶ月後に行います
1歳をすぎて未接種の場合は、早めの接種をおすすめします（任意接種）

3種混合追加接種（任意）
2種混合追加接種（任意）
4種混合追加接種（任意）

1回目の6~28日後に2回目、
2回目の1年後に3回目

5種混合を接種

1回目の2~4週間後に2回目、2回目の半年後に3回目

1回目の6~12か月後に2回目

【1歳から接種可能】 1回目の2~4週間後に2回目、2回目の半年後に3回目

【1歳から接種可能】 1回目の6~12か月後に2回目

■接種開始が1~15歳は [2回接種] 1回目の6~12か月に2回目
■接種開始が16歳以上は [3回接種] 1回目の1か月後に2回目、1回目の半年後に3回目

通常3週間隔で2回。2回目後、5ヶ月以上あけて3回目

■Modernaワクチン [2回接種] 1回目の8週間後に2回目 ※5~17歳にPfizerワクチンを1回追加接種
■Pfizerワクチン [3回接種] 1回目の8週間後に2回目、2回目の8週間後に3回目

■Pfizerワクチン [3回接種] 1回目の8週間後に2回目、2回目の5か月後に3回目

[日本・シンガポール対比]

予防接種スケジュール表

接種可能年齡

定期予防接種の対象年齢